

## ESCORE ABCD para Ataque Isquêmico Transitório / AIT

Escore utilizado como preditor de risco de AVC isquêmico, durante os primeiros sete dias após a ocorrência de um Ataque Isquêmico Transitório (AIT). Estudos demonstraram um risco de AVCI acima de 30% em pacientes com escore ABCD de 6 pontos, em relação aos pacientes com escores ABCD menores. Útil para identificar e orientar a conduta clínica nos pacientes com AIT na emergência, se precisam, por exemplo, de investigação emergencial ou monitorização mais intensiva.

Fator de Risco	Categoria	Escore
A. Idade (Age)	Idade $\geq$ 60 anos Idade $<$ 60 anos	1 0
B. Pressão arterial (Blood Pressure)	PAS $>$ 140 ou PAD $\geq$ 90 Outro	1 0
C. Sintomas Clínicos (Clinical symptoms)	Fraqueza unilateral Distúrbio de linguagem Outro	2 1 0
D. Duração do AIT (Duration of TIA)	$\geq$ 60 minutos 10-59 minutos $<$ 10 minutos	2 1 0
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>

---

### Referência:

Rothwell P, Giles M, Flossmann E, Lovelock C, Redgrave J, Warlow C, & Mehta Z. A simple tool to identify individuals at high early risk of stroke after a transient ischaemic attack: the ABCD score. *The Lancet* 2005;366:29-36.