

Escala FOUR

FOUR de Full Outline of UnResponsiveness. Escala desenvolvida pelo grupo de neurointensivismo da Mayo Clinic, foi publicada em 2005 (referência abaixo). No paper original, você poderá encontrar esquema gráfico contendo as explicações de como aplicar a escala.

=====

Resposta ocular

- 4 = Pálpebras abertas, acompanha com o olhar, ou pisca ao comando
- 3 = Pálpebras abertas mas não acompanha com o olhar
- 2 = Olhos fechados mas abrem com estímulo auditivo forte (loud voice)
- 1 = Olhos fechados mas abrem apenas com dor
- 0 = Não há abertura ocular, mesmo à dor

Resposta Motora

- 4 = Faz sinal de OK com as mãos, fecha o punho, ou “sinal de paz”
- 3 = Localiza a dor
- 2 = Resposta em flexão à dor
- 1 = Resposta em extensão à dor
- 0 = Sem respostas à dor ou mioclonias generalizadas

Reflexos de Tronco Cerebral

- 4 = Presentes reflexos pupilares e corneanos
- 3 = Uma pupila fixa e midriática
- 2 = Reflexos corneanos ou pupilares ausentes
- 1 = Ambos os reflexos corneanos e pupilares ausentes
- 0 = Ausência de reflexos corneanos, pupilares ou de tosse

Respiração

4 = Não-entubado, com padrão respiratório regular, normal

3 = Não-entubado, com padrão respiratório Cheyne-Stokes

2 = Não-entubado, com padrão respiratório irregular

1 = Respira com frequência respiratória acima do ventilador

0 = Respira com a frequência respiratória do ventilador, ou apneia

=====

Ref.: Wijdicks et al. Validation of a New Coma Scale: The FOUR Score. Ann Neurology 2005; 58: 585-93.